

Circovac

[Ver producto](#)



S/426.00 (¡oferta!)

- Aplicar una inyección de 0,5 mL vía IM a partir de la 3ª semana de edad
 - Con inicio de la inmunidad en 2 semanas.
 - Con Duración de la inmunidad hasta de 14 semanas después de la vacunación.
- ¡Haz tu pedido!

[Añadir al carrito](#)

Descripción

Vacuna indicada para la inmunización activa o pasiva de lechones con el objetivo de reducir en éstos la excreción viral, lesiones y signos clínicos causados por Circovirus tipo 2, agente del Síndrome de desgaste multisistémico porcino.

Posología

- Lechones: [Inmunización](#) activa de lechones para reducir la excreción fecal de PCV2 y la carga viral en la sangre, y como ayuda en la reducción de los signos clínicos asociados al PCV2, incluyendo el desmedro, pérdida de peso y mortalidad; y también la reducción de la carga viral y lesiones en tejido linfoide asociados a la infección por PCV2.

-Aplicar una inyección de 0,5 mL vía IM a partir de la 3ª semana de edad

-Con inicio de la inmunidad en 2 semanas.

-Con Duración de la inmunidad hasta de 14 semanas después de la vacunación.

-Para ser suministrada en cerdos (Chanchillas, hembras reproductoras y lechones de 3 semanas de edad o mayores).

Envíos a todo [Perú](#).

Categoría: [Vacunas](#)